



FICHE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT

Conisation

Version : 01

Date : 29/01/2025

Page 1 sur 2

Votre médecin vous a proposé une intervention nommée conisation. La présente feuille a pour but de renforcer les informations qui vous ont été apportées oralement par le médecin afin de vous expliquer les principes, les avantages et les inconvénients potentiels de l'opération qu'il vous a conseillée.

Qu'est-ce qu'une conisation ?


La conisation consiste à enlever chirurgicalement une portion du col utérin.

La pièce prélevée est en forme de cône, sa base est plus ou moins large (1 à 2 cm), sa hauteur est en moyenne de 15 mm.

Elle est réalisée le plus souvent devant l'existence d'anomalies du col. En l'absence de traitement, ces lésions peuvent évoluer après plusieurs années vers un cancer du col de l'utérus, ce qui justifie l'ablation d'une portion de celui-ci.

L'intervention a deux buts principaux :

- 1- Elle permet de confirmer la nature exacte de la lésion et son étendue à la surface du col et dans la portion de canal cervical qui a été enlevée.
- 2- Elle est également thérapeutique, c'est-à-dire qu'elle normalise le col et rend exceptionnelle l'évolution vers un cancer du col



Comment se passe l'opération ?

L'intervention peut être réalisée sous anesthésie générale, locorégionale (péridurale, rachi-anesthésie), ou locale selon votre cas et votre préférence.

La conisation s'effectue par les voies naturelles. Elle peut être réalisée à l'aide d'un bistouri, d'une anse électrique ou d'un laser. L'utilisation d'une anse électrique est la plus fréquente.

Y-a-t-il des risques ou inconvénients ?

La conisation est une intervention fréquente, rapide, qui comporte peu de risques. Le principal risque est hémorragique. Le risque de saignement existe dès les premières heures, et pendant les 15 jours suivant l'intervention. La survenue d'un saignement continu doit faire consulter dès que possible votre médecin.

Cela peut nécessiter la mise en place d'un tamponnement par une mèche (compresse) vaginale. Dans de rares cas, l'hémorragie peut nécessiter une réintervention.

La conisation ne provoque aucune douleur postopératoire, éventuellement une gêne transitoire évoquant des règles douloureuses.

Cette opération préserve la possibilité de grossesse ultérieure. Les conséquences sur la fécondité sont rares. Il existe une légère augmentation du risque d'accouchement prématuré pour les grossesses ultérieures, et il conviendra de signaler cet antécédent de conisation au(x) professionnel(s) qui suivra(ont) votre(vos) prochaine(s) grossesse(s).

Tardivement, un rétrécissement (sténose) du col peut survenir et empêcher l'écoulement normal des règles et la surveillance ultérieure du col. Cette sténose peut nécessiter une simple dilatation et plus rarement une nouvelle intervention. Rarement, elle peut entraîner des difficultés d'ouverture du col au moment d'un accouchement.

Centre Hospitalier Denain
25 Av. Jean Jaurès, 59220, Denain

Fiche d'information inspirée de celle du CNGOF, « conisation », rédaction 1999- révision 2017.



**FICHE D'INFORMATION
ET DE CONSENTEMENT**

Conisation

Version : 01

Date : 29/01/2025

Page 2 sur 2

En pratique :

Avant l'opération :

- une consultation pré-anesthésique doit être réalisée systématiquement avant toute intervention sous anesthésie générale ou loco-régionale ;
- vous serez hospitalisée le matin même ou la veille de l'opération ;
- une perfusion sera mise en place puis l'anesthésie sera effectuée.

• Après l'opération :

- en cas d'anesthésie générale ou loco-régionale, vous passerez en salle de réveil avant de retourner dans votre chambre ;
- la sortie a généralement lieu le jour même ;
- une mèche ou compresse est parfois laissée en place dans les suites immédiates et retirée avant votre sortie ;
- il est recommandé d'attendre environ un mois après l'opération pour reprendre une activité sexuelle ;
- évitez les longs déplacements et les activités sportives soutenues dans les 20 jours qui suivent ;
- évitez les bains pendant 15 jours. Les douches sont sans problème ;
- l'examen histologique de la pièce de conisation est très minutieux ; le résultat de cette analyse vous sera communiqué par votre médecin et éventuellement commenté lors de la visite postopératoire ;
- si des saignements d'abondance supérieure à des règles apparaissent après votre retour à domicile, il est indispensable de consulter en urgence dans l'établissement de soins qui vous a pris en charge et/ou d'informer votre médecin ;
- il est indispensable de poursuivre la surveillance du col après l'intervention comme convenu en consultation.

Centre Hospitalier Denain
25 Av. Jean Jaurès, 59220, Denain

Fiche d'information inspirée de celle du CNGOF, « conisation », rédaction 1999- révision 2017.



Collège National des Gynécologues et Obstétriciens