



INFORMATIONS MEDICALES AVANT LA REALISATION D'UNE POLYPECTOMIE

Madame, Monsieur,

La polypectomie est l'ablation des polypes qui obstruent les fosses nasales.

Afin que vous soyez clairement informé du déroulement de cette intervention, nous vous demandons de lire attentivement ce document d'information. Votre chirurgien est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

N'oubliez pas de dire à votre chirurgien les traitements que vous prenez régulièrement, et en particulier Aspirine, anticoagulants... N'oubliez pas de signaler si vous avez déjà présenté des manifestations allergiques, en particulier médicamenteuse ou un asthme. Enfin n'oubliez pas d'apporter, lors de l'hospitalisation, les documents médicaux en votre possession : prises de sang, examens radiologiques (scanner) notamment.

BUT DE L'INTERVENTION

L'intervention a pour but de pratiquer l'ablation d'un ou plusieurs polypes pour améliorer la perméabilité nasale, ainsi que celle des sinus, ou pour les faire analyser.

REALISATION DE L'INTERVENTION

L'intervention est pratiquée sous anesthésie locale, le plus souvent. Selon l'importance de la polyposis, une anesthésie générale peut être nécessaire. Dans ce dernier cas, une consultation d'anesthésie pré-opératoire est indispensable. Il est de la compétence du médecin-anesthésiste-réanimateur de répondre à vos questions relatives à sa spécialité.

L'intervention est réalisée par les voies naturelles (voie endonasale) sans cicatrice extérieure ;

l'opérateur peut être amené à utiliser des instruments optiques, et éventuellement un contrôle vidéo.

La durée de l'hospitalisation et les soins post-opératoires vous seront précisés par votre chirurgien.

RISQUES IMMEDIATS

Une hémorragie nasale peut survenir.

RISQUES SECONDAIRES

Cette intervention ne met pas à l'abri de la récurrence des polypes.

COMPLICATIONS GRAVES ET/OU EXCEPTIONNELLES

Tout acte médical, investigation, exploration, intervention sur le corps humain, même conduit dans des conditions de compétence et de sécurité conformes aux données actuelles de la science et de la réglementation en vigueur, recèle un risque de complication.

Des complications respiratoires, notamment une crise d'asthme, peuvent survenir surtout chez les patients allergiques et/ou asthmatiques.

Des troubles de la vue (vision floue, vision double ou baisse de la vision) sont très exceptionnels. Ils surviennent précocement après l'intervention et doivent être signalés immédiatement à votre chirurgien.

Une fuite de liquide céphalo-rachidien peut survenir de façon tout à fait exceptionnelle.